

Cukorbetegség esetén alkalmazott erőforrás támogatás

Használandó készülék: **Vitafon-T**

(forrás: www.vsegdazdorov.ru , a magyar összefoglalót írta Bartha Ferenc)

Okozhatnak gerincproblémák is cukorbetegséget? A válasz igen.

A gerincvelő szerepet játszik a belső szervek vezérlésében. Arra a következtetésre jutottunk, hogy okozhatnak a gerincproblémák cukorbetegséget. A cukorbetegség évek alatt, szinte tünetmentesen alakul ki. A betegek sokszor nem is tesznek említést gerincpanaszokról. Ugyanakkor ismert az a tény, hogy a vízszintesen tartott karok vonalát meghosszabbítva, a napfonat magasságában éppen ott keresztezzük a gerincoszlopot, ahol a máj és hasnyálmirigy vezérlő idegei lépnek ki a gerincoszlopból. Terhek emelésekor és cipelésekor a gerincoszlopnak éppen ez a szakasza kapja a legnagyobb terhelést a karok felől. Az esetleges apróbb elváltozásokat sem a röntgen, sem a CT, sem az ultrahang nem mutatja ki, de egy gyakorlott oszteopata ki tudja tapintani az apróbb duzzanatot.

Volt olyan eset is, amikor a hangszórókat a derekát fájlaló idős hölgy unokája jóval följebb tette, a nyak és mellkas magasságába és egy idő után 12-14-ről 4,3 és 5,2 közé állt vissza a vércukra. Megszűnt a zsibbadás is a karjaiban. 11 éven át volt cukorbeteg.

Nem ritka, hogy a gerincoszlop rehabilitálása 3-9 hónapig is eltart (N.B. sajnos a lassan kialakuló betegségek gyógyítása is egy lassú folyamat, kitartást igényel). Feltételezzük, hogy a gerincproblémák rontják a hasnyálmirigy területén mikrovibrációt generáló izomrostok innervációját. Ezért is fontos a mikrovibrációs kezelés közvetlenül a hasnyálmirigy területén is (NB. természetesen a máj, a gerinc és a vese kezelése mellett).

Különösen hatékony ez a kezelés a 2-es típusú cukorbetegsége esetében.

Terület/pont	Minden területet/pontot naponta kétszer kell kezelni			
	Üzem mód	Első kezelés	Kezelési idő növelése	Egy kezelés maximum
Vese «K»	2	10 perc	Napi 2 perc plusz.	40 perc
Máj «M»	1	5 perc	Napi 1 perc plusz..	10 perc
*Hasnyálmirigy «M9»	1	2 perc	Napi 1 perc plusz..	Napi 2x15 perc, vagy 5-10 perc étkezés után.
Gerinc «E11»	1	2 perc	Másnaponként 1 perc plusz.	5 perc
Gerinc «E2»	1	2 perc	Másnaponként 1 perc plusz.	5 perc
Gerinc «E21»	1	2 perc	Másnaponként 1 perc plusz.	5 perc

*Az «M9» pont a hasnyálmirigy vetülete a hason. A legjobb minden étkezés után 5-10 percet kezelni.


A nem inzulinos betegek komplex gyógyításának fontos része a mikrovibrációs erőforrás támogatás. Így hatékonyabbak lehetnek a nem inzulin alapú készítmények is. A mikrovibráció segíti a hasnyálmirigy nyirok és vénás visszaáramlását. Javítja a béta sejtek tápellátását, a saját inzulin termelést. Javítja a közérzetet, csökkenti a mellékhatások kockázatát.

Ez a kezelés nem helyettesíti az orvosi kezelést, a diétát, életmód váltást.

A cukorbetegségtől leghamarabb a vesék szenvednek. A veseszövet elhalás egy jellemző mellékhatás. A vesefunkció romlás a perifériás vérkeringés romlásához vezet. Gyakori a cukorbeteg talp (fekély). Ilyen esetekben nagy a gangréna kockázata. A vese vitafonozása javítja a vesefunkciót, így megelőzhetőek a mellékhatások. A veséket tévézés közben este, vagy ágyban fekvve is kezelhetik. A párnák, vagy az ágybetét és a takaró kitűnően elnyelik a környezetet esetleg zavaró hangokat.

A kezelendő területek/pontok megtalálását az alábbi képek segítik.

M-M, M9-M9 pontok kezelésénél a két hangszóró között mintegy 3-5 cm távolság van.



A vonalak a lapockát és az alsó bordákat jelölik.